

Gentile Signora,  
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

---

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario** definito:

### **RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI A LIVELLO ADDOME-PELVI**

**La informiamo** che tale trattamento potrà essere preceduto da foto, TC di centraggio con sistemi di immobilizzazione, tatuaggi o altre procedure diagnostiche necessarie al trattamento a cui acconsente.

**La informiamo** che ci possono essere effetti collaterali o complicazioni derivanti dal trattamento radiante sia durante che subito dopo lo stesso (cd *Reazioni Acute*) o qualche tempo dopo il termine (cd *Reazioni tardive*). Molti di tali effetti collaterali o complicazioni sono temporanei e regrediscono entro qualche settimana dopo il termine della radioterapia. Alcuni di tali effetti, tuttavia, possono essere permanenti.

Tali Reazioni possono essere peggiorate dalla terapia sistemica dalla chirurgia eseguite prima, durante o dopo il trattamento radiante e/o da trattamenti radianti eseguiti in precedenza sulla stessa zona.

**La informiamo** che le Reazioni Acute e Tardive che possono derivare dal trattamento sono elencate sotto. Con poche eccezioni tali reazioni coinvolgono solo le aree che effettivamente ricevono le radiazioni.

#### **Reazioni Acute:**

- eritema cutaneo (arrossamento della pelle), disepitelizzazione ed epidermiolisi della cute su zone limitate, necrosi cutanea specie se è associata la chemioterapia;
- nausea, vomito, meteorismo, dolori addominali, diarrea, flatulenza, stitichezza;
- riacutizzazione di disturbi emorroidari, bruciori ano-rettali, proctite (infiammazione al retto), rettorragie (sanguinamenti rettali);
- disuria (bruciori urinari), stranguria (minzione dolorosa), aumento della frequenza urinaria diurna (pollachiuria) e notturna (nicturia), cistiti infettive (infezione della vescica) e delle vie urinarie inferiori, ematuria (sanguinamento urinario), anuria (blocco della minzione) e possibile insufficienza renale, uretrite (infiammazione dell'uretra);
- leucopenia (riduzione dei globuli bianchi), piastrinopenia (riduzione delle piastrine), anemia (riduzione dei globuli rossi).

 	<b>DIPARTIMENTO DI CLINICA RICERCA E TECNOLOGIE AVANZATE MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI A LIVELLO ADDOME-PELVI.</b>	<b>UOC DM – UOC RADIOTERAPIA MOD 06-2022 Rev. 00 07.03.2022 PAG 2 DI 2</b>
---	---	--

**Reazioni Tardive:**

- fibrosi del sottocutaneo e discromie dell'apparato cutaneo (indurimento e retrazione della cute, ed alterazione del colore della pelle), distrofia cutanea e/o telangectasie (comparsa di piccoli vasi superficiali), alopecia (perdita di peli nelle zone irradiate);
- perdita della fertilità (talora già preesistente per pregressa chemioterapia), dispareunia (difficoltà o dolore nell'atto sessuale) soprattutto in associazione con la chirurgia), menopausa precoce nelle donne fertili (talora già indotta dalla chemioterapia);
- riduzione e/o scomparsa dell'eiaculazione, azoospermia (assenza di spermatozoi nel liquido seminale), disturbi erettivi;
- rettorragia persistente (perdite di sangue dal retto), teleangectasie (comparsa di piccoli vasi superficiali facilmente sanguinanti) con edema e modificazioni infiammatorie della mucosa rettale, ulcere rettali, sindrome da malassorbimento intestinale, diarrea cronica, occlusione intestinale, fistole o necrosi del piccolo intestino, stenosi anali, ragadi anali, ulcerazioni rettali;
- riduzione del numero di globuli bianchi piastrine con ipoplasia midollare permanente (possibile preesistenza del danno a causa della chemioterapia);
- riduzione delle difese immunitarie;
- osteonecrosi delle teste femorali (specie se precedenti terapie cortisoniche);
- tumori radioindotti;
- incontinenza urinaria e fecale;
- sindrome della cauda equina (paralisi rettale e vescicale, anestesia a sella, ecc.);
- cistiti emorragiche (infezioni della vescica con espulsioni di coaguli), occlusione delle vie urinarie; stenosi uretrale (restringimento parziale o totale dell'uretra), stenosi uretero-vescicali, ematuria (sanguinamento urinario), riduzione della capacità vescicale, fistole urinarie, insufficienza renale;
- edema arti inferiori (gonfiore delle gambe);
- edema dello scroto e del pene (rigonfiamento dello scroto e del pene).

**La informiamo** che non le possiamo dare assicurazioni o garanzie riguardanti l'esito positivo del trattamento.

**La informiamo** che le radiazioni possono essere dannose per bambini non ancora nati.

**La informiamo** che il trattamento sanitario sopra descritto può causare sterilità (temporanea o permanente), e/o malformazioni congenite nella prole. Per tale motivo se lo desidera può effettuare la preservazione del seme/degli ovuli prima dello stesso.

**La informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma lì \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_