

Gentile Signora,
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario** definito:

RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI A LIVELLO CUTANEO

La informiamo che tale trattamento potrà essere preceduto da foto, TC di centraggio con sistemi di immobilizzazione, tatuaggi o altre procedure diagnostiche necessarie al trattamento a cui acconsente.

La informiamo che ci possono essere effetti collaterali o complicazioni derivanti dal trattamento radiante sia durante che subito dopo lo stesso (cd *Reazioni Acute*) o qualche tempo dopo il termine (cd *Reazioni tardive*). Molti di tali effetti collaterali o complicazioni sono temporanei e regrediscono entro qualche settimana dopo il termine della radioterapia. Alcuni di tali effetti, tuttavia, possono essere permanenti.

Tali Reazioni possono essere peggiorate dalla terapia sistemica dalla chirurgia eseguite prima, durante o dopo il trattamento radiante e/o da trattamenti radianti eseguiti in precedenza sulla stessa zona.

La informiamo che le Reazioni Acute e Tardive che possono derivare dal trattamento sono elencate sotto. Con poche eccezioni tali reazioni coinvolgono solo le aree che effettivamente ricevono le radiazioni.

Reazioni Acute:

- eritema, edema, desquamazione secca, desquamazione essudativa, sovra infezioni, perdita dei follicoli piliferi e ghiandole sudoripare;
- mucositi (se il distretto cutaneo irradiato è della regione cervico cefalica);
- leucopenia (riduzione dei globuli bianchi), piastrinopenia (riduzione delle piastrine).

Reazioni Tardive:

- discromia cutanea, ulcere;
- fibrosi cutanea, sottocutanea e muscolare;
- atrofia cute e annessi;
- alopecia;
- comparsa di lesioni precancerose;
- insorgenza di secondi tumori;
- necrosi ossea e cartilaginea;
- tragitti fistolosi.

La informiamo che non le possiamo dare assicurazioni o garanzie riguardanti l'esito positivo del trattamento.

La informiamo che le radiazioni possono essere dannose per bambini non ancora nati.

La informiamo che se il trattamento sanitario sopra descritto riguarda la cute della regione pelvica e/o inguinale, può causare sterilità (temporanea o permanente), e/o malformazioni congenite nella prole. Per tale motivo se lo desidera può effettuare la preservazione del seme/degli ovuli prima dello stesso.

La informiamo che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma li ___/___/___