

Gentile Signora,
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario** definito:

RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI A LIVELLO OSSEO

La **informiamo** che tale trattamento potrà essere preceduto da foto, TC di centraggio con sistemi di immobilizzazione, tatuaggi o altre procedure diagnostiche necessarie al trattamento a cui acconsente.

La **informiamo** che ci possono essere effetti collaterali o complicazioni derivanti dal trattamento radiante sia durante che subito dopo lo stesso (cd *Reazioni Acute*) o qualche tempo dopo il termine (cd *Reazioni tardive*). Molti di tali effetti collaterali o complicazioni sono temporanei e regrediscono entro qualche settimana dopo il termine della radioterapia. Alcuni di tali effetti, tuttavia, possono essere permanenti.

Tali Reazioni possono essere peggiorate dalla terapia sistemica dalla chirurgia eseguite prima, durante o dopo il trattamento radiante e/o da trattamenti radianti eseguiti in precedenza sulla stessa zona.

La **informiamo** che le Reazioni Acute e Tardive che possono derivare dal trattamento sono elencate sotto. Con poche eccezioni tali reazioni coinvolgono solo le aree che effettivamente ricevono le radiazioni.

Reazioni Acute:

- riduzione dei globuli bianchi, piastrine, globuli rossi (leucopenia, piastrinopenia, anemia);
- insorgenza o aumento del dolore a livello della regione trattata;
- edema e/o infiammazione dei tessuti circostanti;
- stanchezza;
- nausea, vomito ed esofagite;
- cistite;
- diarrea o stipsi;
- alterazioni cutanee: arrossamento, irritazione, desquamazione,
- ispessimento cutaneo, perdita dei peli e/o capelli;
- tosse, infiammazione delle vie aeree superiori;
- secchezza e/o irritazione degli occhi (oftalmie e congiuntivite);
- mielite transitoria (con sensazione di scariche elettriche).

Reazioni Tardive:

- persistenza del dolore della regione irradiata;

- carie dentali, alterazioni gengivali, caduta dei denti;
- danni alle strutture ossee fino alla necrosi ossee;
- eventi scheletrici consistenti in crolli vertebrali e fratture radioindotte;
- irrigidimento (anchilosi) e limitazione funzionali dei movimenti;
- discromie cutanee e/o persistenza di alopecia nella regione irradiato;
- danni all'encefalo, al tronco encefalico, al midollo spinale, ai nervi cranici ed extracranici con conseguente alterazione della funzionalità e/o perdita della forza e/o sensibilità e/o coordinazione in qualunque parte del corpo;
- peggioramento o ricomparsa dei sintomi iniziali;
- danni alla ipofisi o alla tiroide che richiedano una terapia ormonale sostitutiva;
- danni alla carotide con rischio di ictus cerebrali;
- danni vascolari sino alla rottura del vaso con conseguente emorragia fatale;
- infertilità;
- tumori radioindotti.

La informiamo che non le possiamo dare assicurazioni o garanzie riguardanti l'esito positivo del trattamento.

La informiamo che le radiazioni possono essere dannose per bambini non ancora nati.

La informiamo che il trattamento sanitario sopra descritto della regione pelvica e/o femorale può causare sterilità (temporanea o permanente), e/o malformazioni congenite nella prole. Per tale motivo se lo desidera può effettuare la preservazione del seme/degli ovuli prima dello stesso.

La informiamo che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma li ___/___/___