

Gentile Signora,
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario** definito:

RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI A LIVELLO RETROPERITONEALE

La informiamo che tale trattamento potrà essere preceduto da foto, TC di centraggio con sistemi di immobilizzazione, tatuaggi o altre procedure diagnostiche necessarie al trattamento a cui acconsente.

La informiamo che ci possono essere effetti collaterali o complicazioni derivanti dal trattamento radiante sia durante che subito dopo lo stesso (cd Reazioni Acute) o qualche tempo dopo il termine (cd Reazioni tardive).

Molti di tali effetti collaterali o complicazioni sono temporanei e regrediscono entro qualche settimana dopo il termine della radioterapia.

Alcuni di tali effetti, tuttavia, possono essere permanenti.

Tali Reazioni possono essere peggiorate dalla terapia sistemica, dalla chirurgia eseguite prima, durante o dopo il trattamento radiante e/o da trattamenti radianti eseguiti in precedenza sulla stessa zona.

La informiamo che le Reazioni Acute e Tardive che possono derivare dal trattamento sono elencate sotto. Con poche eccezioni tali reazioni coinvolgono solo le aree che effettivamente ricevono le radiazioni.

Reazioni Acute:

- astenia, nausea, vomito;
- dolori addominali, diarrea, polmonite basale, pleurite basale;
- leucopenia, piastrinopenia, anemia;
- incremento dei valori ematochimici riguardo a funzionalità epatica e renale;
- proctite, cistite;
- eritema cutaneo;
- disepitelizzazione ed epidermiolisi cute irradiata;
- epilazione.

Reazioni Tardive:

- fibrosi dei tessuti irradiati;
- distrofie e discromie cutanee;

- taleangectasie;
- alopecia;
- nelle donne perdita della fertilità;
- fistole eritriche e/o coliche e/o vescicali;
- insufficienza renale, nefrite, ostruzione intestinale, ipertensione;
- tumori radioindotti.

La informiamo che non le possiamo dare assicurazioni o garanzie riguardanti l'esito positivo del trattamento.

La informiamo che le radiazioni possono essere dannose per bambini non ancora nati.

La informiamo che il trattamento sanitario sopra descritto può causare sterilità (temporanea o permanente), e/o malformazioni congenite nella prole. Per tale motivo se lo desidera può effettuare la preservazione del seme/degli ovuli prima dello stesso.

La informiamo che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma li ___/___/_____