	DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER RESEZIONE OMERO DISTALE E RICOSTRUZIONE CON PROTESI MODULARE ONCOLOGICA DI GOMITO	UOC DM – UOC ORTOPEDIA ONCOLOGICA MOD 20-2022 Rev. 00 08.04.2022 PAG 1 DI 5
---	--	--

Gentile Signora,
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

Lei dovrà essere sottoposto a un **intervento di**

RESEZIONE OMERO DISTALE E RICOSTRUZIONE CON PROTESI MODULARE ONCOLOGICA DI GOMITO

Descrizione:

La resezione dell'omero distale e ricostruzione con protesi modulare oncologica è indicata generalmente in pazienti affetti da lesioni estese all'omero distale e/o ai tessuti molli circostanti in tumore primitivo dell'osso, tumore metastatico a prognosi favorevole e lungo intervallo libero da malattia, responsività a trattamenti sistemici, metastasi solitaria o oligometastasi, frattura patologica o in localizzazione ossea da malattia emolinfoproliferativa con frattura patologica o lesione ad alto rischio di frattura patologica.


Questo intervento può essere eseguito con varie vie di accesso ma quella più in uso è la via laterale diretta al gomito e si compone di due tempi, il primo tempo consiste nella resezione dell'omero distale, con asportazione ampia della neoplasia; il secondo tempo consiste nella ricostruzione del segmento asportato mediante una protesi modulare prevalentemente metallica con componenti in polietilene. Per il fissaggio all'osso ospite può essere utilizzata una resina acrilica, il PMMA (poli-metil-meta-acrilato), materiale cementante che può anche contenere sostanze antibiotate. La resezione dell'omero distale è solitamente intrarticolare, ma quando sia interessata dalla neoplasia direttamente l'articolazione del gomito si rende necessaria una resezione extrarticolare di gomito.

La protesi modulare oncologica di gomito è composta da due parti:

- corpo protesico standard (+ prolungha in base alla lunghezza di resezione);
- stelo endomidollare.

Vi è poi la controparte ulnare con il solo stelo o anche un corpo protesico ulnare (doppia protesi in caso la neoplasia interessi anche il versante ulnare) che si articola con uno snodo con la protesi d'omero.

Esistono diversi tipi di protesi e il sistema protesico da utilizzare viene scelto dal chirurgo in base al tipo di lesione, alle condizioni del paziente e ai vantaggi di ogni sistema protesico. L'asportazione dell'omero distale richiede nella maggior parte dei casi il distacco di gran parte della muscolatura del gomito e l'asportazione dei muscoli infiltrati dalla neoplasia; pertanto per permettere la cicatrizzazione dei tessuti residui, dopo l'intervento chirurgico, all'arto operato, si applica generalmente un tutore reggibraccio da

	DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER RESEZIONE OMERO DISTALE E RICOSTRUZIONE CON PROTESI MODULARE ONCOLOGICA DI GOMITO	UOC DM – UOC ORTOPEDIA ONCOLOGICA MOD 20-2022 Rev. 00 08.04.2022 PAG 2 DI 5
---	--	--

indossare per un tempo variabile e comunque almeno fino alla guarigione completa della ferita chirurgica. Altre alternative ricostruttive, di solito estremamente personalizzate, alla protesi dopo resezione sono innesti di banca o/o autologhi vascolarizzati o no e spaziatori di solito temporanei in cemento chirurgico.

Note Speciali:

L'intervento viene solitamente effettuato in Anestesia Generale, e di solito non richiede il ricovero in Terapia Intensiva nel post-operatorio. E' difficile stabilire a priori il periodo di degenza nel decorso post-operatorio; esso è correlato alla situazione specifica del caso ma nella maggior parte dei casi, in assenza di complicazioni rilevanti, si aggira tra i 7 e i 10 giorni. La protesi di omero distale consente il salvataggio dell'arto ma dal punto di vista funzionale, in particolare nei pazienti anziani, anche dopo trattamento FKT, consente una ripresa solo parziale e spesso non soddisfacente dei movimenti del gomito, mantenendo comunque la possibilità di utilizzare in modo valido la spalla ed in assenza di complicazioni neuro-vascolari, il polso e la mano.

Alternative terapeutiche:

L'unica alternativa possibile di tipo conservativo alla protesi d'omero distale consiste nell'artrodesi di gomito (in flessione neutrale e lieve extrarotazione dell'avambraccio) che consente il salvataggio dell'arto ma un risultato funzionale fortemente invalidante non paragonabile assolutamente a quello della protesi di gomito.


Solo per i pazienti metastatici multipli e in condizioni generali difficili, altre alternative consistono in asportazioni NON oncologicamente adeguate della neoplasia con elevatissima possibilità di ripresa/progressione della malattia oppure un trattamento non chirurgico: radioterapia, trattamenti farmacologici, elettrochemioterapia, termoablazione, criochirurgia, FUS; questi trattamenti tuttavia solitamente non forniscono, con le tecniche attuali, le stesse possibilità di eradicazione locale della malattia.

Complicazioni:

Gli interventi chirurgici in ortopedia oncologica sono gravati da una elevata incidenza di complicazioni dovuti ad una estesa dissezione ed asportazione dei tessuti molli (muscoli e tendini), lunghi tempi dell'intervento, l'ampio volume delle protesi e l'esposizione a chemioterapia e radioterapia. Le complicanze che possono manifestarsi sono (in ordine di frequenza):

Sanguinamento: L'intervento è gravato da un moderato rischio di sanguinamento intraoperatorio, che può comportare la necessità di eseguire varie trasfusioni di sangue; questo dipende dall'ampia dissezione dei tessuti molli e dalla ipervascolarizzazione del tumore.

Ritardo di cicatrizzazione della ferita può essere sostenuto da alterazioni della circolazione locale ed in base a ciò può presentare diverse forme di gravità clinica, da semplici fenomeni di arrossamento della cute

	DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER RESEZIONE OMERO DISTALE E RICOSTRUZIONE CON PROTESI MODULARE ONCOLOGICA DI GOMITO	UOC DM – UOC ORTOPEDIA ONCOLOGICA MOD 20-2022 Rev. 00 08.04.2022 PAG 3 DI 5
---	--	--


con transitoria essudazione, a vere e proprie deiscenze con necrosi dei tessuti che possono comportare notevoli allungamenti dei tempi di guarigione della ferita. Tale complicanza può richiedere tempi chirurgici successivi.

Infezione della protesi modulare: Diversi fattori possono contribuire al fallimento dell’impianto protesico. L’estesa dissezione, i lunghi tempi dell’intervento, l’ampio volume delle protesi e l’esposizione a chemioterapia e radioterapia determinano un più alto rischio di infezione. Si può manifestare in forma acuta e precoce con febbre molto elevata, forte dolore all'arto operato che presenta secrezione della ferita e calore locale, oppure in maniera più subacuta e tardiva, con febbricola persistente, dolore locale ed eventuali fistolizzazioni cutanee secondarie. In tali casi la causa del processo può essere riconducibile ad estensione per via ematogena di processi infettivi a distanza (cistiti, infezioni odontogene, etc..) anche se molto spesso risulta difficile precisarne l’origine. L’infezione di una protesi modulare oncologica è una complicanza molto importante ma che a volte può essere dominata con la ripresa della somministrazione di antibiotici per alcune settimane in dosi massicce. Se l’infezione è “precoce” ovvero si è instaurata da poco tempo si esegue pulizia chirurgica eventualmente associata a sterilizzazione del corpo protesico. Se questo trattamento non ha esito positivo si può arrivare all’espianto della protesi con il posizionamento di uno spaziatore addizionato con antibiotici, e ad un eventuale ulteriore successivo intervento di reimpianto protesico. Per ridurre al minimo il rischio di tale complicanza viene come detto praticata una profilassi antibiotica prima dell’intervento chirurgico.

Fratture intraoperatorie: rappresentano una complicanza piuttosto rara, legata per lo più a fragilità del tessuto osseo interessato per cause osteoporotiche: tali fratture possono rendere necessario il ricorso a tempi chirurgici complementari (osteosintesi di vari tipi).

Dismetria: è la differenza di lunghezza che può residuare tra i due arti superiori al termine dell’intervento; può dipendere da fattori meccanici intraoperatori o da situazioni locali preesistenti relative alla patologia in oggetto (ad esempio frattura patologica). A differenza della dismetria degli arti inferiori però, quella degli arti superiori è molto meno importante come complicanza, sia per perché meno apparente e manifesta, sia soprattutto perchè funzionalmente gli arti superiori sono più indipendenti tra di loro rispetto agli arti inferiori.

Lussazione della protesi: Le protesi di gomito sono solitamente “vincolate” quindi lo snodo articolare si può rompere ma non lussare spontaneamente. Nel caso raro che venga utilizzata una protesi non vincolata va detto che l’asportazione dell’omero distale comporta necessariamente il distacco di parte della muscolatura del braccio e/o dell’avambraccio, che è alla base del maggior tasso di lussazioni rispetto alla normale chirurgia protesica. Per ridurre il rischio di dislocazione dell’impianto protesico, è pertanto necessaria una meticolosa ricostruzione dei tessuti molli. Le variabili che influenzano significativamente la lussazione sono: età anziana del paziente (>60 anni); tumori ossei primitivi maligni (che comportano una grave dissezione delle strutture muscolari infiltrate dalla neoplasia per poter ottenere dei margini ampi). I pazienti che hanno sviluppato una lussazione, quando possibile, vengono trattati in modo conservativo, mediante riduzione in narcosi a cielo chiuso. Qualora la lussazione risultasse irriducibile o si riscontrasse

	DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER RESEZIONE OMERO DISTALE E RICOSTRUZIONE CON PROTESI MODULARE ONCOLOGICA DI GOMITO	UOC DM – UOC ORTOPEDIA ONCOLOGICA MOD 20-2022 Rev. 00 08.04.2022 PAG 4 DI 5
---	--	--

stiramento di nervi e/o altre strutture dell'arto superiore, potrebbe essere necessaria riduzione cruenta mediante nuovo intervento chirurgico.

Mobilizzazione asettica della protesi: è di solito una complicanza tardiva (diversi anni). La protesi, infatti, è un costrutto meccanico che si consuma producendo detriti da usura che provocano la mobilizzazione. Non si tratta di un fenomeno di rigetto, inesistente nei confronti di questi materiali, bensì di una reazione dell'organismo nei confronti di questi detriti microscopici, aggrediti come corpi estranei. I giovani, che sono più attivi, consumano più rapidamente la loro protesi; in altre parole la mobilizzazione asettica consiste in un progressivo distacco delle componenti protesiche dall'osso non causato da infezioni, frequentemente legato a processi di usura dei materiali. Quando diviene di entità marcata può comportare il reimpianto di una nuova protesi.

Trombosi Venosa Profonda ed Embolia Polmonare: la Trombosi venosa è una occlusione delle vene dell'arto operato (raramente di quello sano controlaterale) che si può manifestare con gonfiore, senso di forte pesantezza all'arto e dolore acuto. Per embolia polmonare si intende invece il distacco di un trombo formatosi in una vena a causa della Trombosi Venosa Profonda. Un trombo che giunge ai polmoni determina dolore toracico, difficoltà respiratoria, tosse, talvolta catarro bronchiale contenente sangue. E' una complicanza molto temibile e pericolosa che obbliga ad un ricovero immediato in un reparto internistico. Per minimizzare i rischi di tali complicanze viene innanzitutto praticata una profilassi a base di eparina da cominciare solitamente prima dell'intervento e che andrà scrupolosamente proseguita dopo la dimissione; altre valide misure preventive sono rappresentate dagli esercizi di mobilizzazione precoce e dall'impiego di calze antitrombotiche agli arti inferiori.


Complicanze vascolari e nervose: Nella resezione di omero distale le lesioni intraoperatorie vascolari possono richiedere la riparazione del vaso e, qualora non fosse possibile, l'esecuzione di by-pass; le lesioni nervose, seppur rare, possono comportare alterazioni funzionali importanti e richiedere la riparazione del nervo.

Recidiva locale e metastasi a distanza: per questo sarà necessario uno stretto follow-up e l'eventuale necessità di ulteriori trattamenti adiuvanti (chemioterapia, radioterapia ecc.) in relazione al risultato istologico definitivo.

Rottura della protesi e/o fratture periprotesi: è statisticamente provato che siano molto rare, tuttavia quando accadono, necessitano di revisione della protesi o osteosintesi.

Allergie a componenti metalliche (ignote precedentemente al paziente): gli impianti protesici sono costituiti da leghe di vari elementi metallici. In alcuni rari casi si possono verificare fenomeni di intolleranza nei confronti di alcuni di questi elementi che possono provocare manifestazioni cliniche a diverse forme di gravità.

Rischi di carattere generale: Oltre a tali complicanze maggiori si devono elencare le complicanze minori, che interessano la maggior parte degli interventi chirurgici che hanno una incidenza totale di circa lo 0,4%

	<p>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA</p> <p>MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER RESEZIONE OMERO DISTALE E RICOSTRUZIONE CON PROTESI MODULARE ONCOLOGICA DI GOMITO</p>	<p>UOC DM – UOC ORTOPEDIA ONCOLOGICA MOD 20-2022 Rev. 00 08.04.2022 PAG 5 DI 5</p>
---	---	---

sul totale degli interventi: complicanze gastrointestinali, urinarie, ipertensione, complicanze cardio-circolatorie, complicanze dermatologiche. Per quanto descritto, desideriamo che il vostro consenso all'intervento sia ragionato e frutto di un'adeguata informazione su benefici e rischi legati all'operazione.

Solo alcune lesioni benigne dell'apparato muscoloscheletrico (Osteoma Osteoide, Lesioni Cistiche, Fibromatosi) possono mantenere un quadro evolutivo stazionario/sporadico miglioramento in assenza di trattamento. In tutti gli altri casi, e specialmente nel caso di neoplasie benigne aggressive o neoplasie maligne, il mancato trattamento porta in tempi più o meno rapidi (in rapporto al singolo Istotipo) ad una evoluzione locale/sistemica della malattia.

La **informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o Tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma li ___/___/___