

	<p>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA</p> <p>MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER CHEMIOTERAPIA CON ABEMACICLIB IN ASSOCIAZIONE ALLA TERAPIA ENDOCRINA</p>	<p>UOC DM – UOC ONCOLOGIA 1 MOD 73-2023 Rev. 00 14.11.2023 PAG 1 DI 2</p>
--	--	---

Gentile Signora,

Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario definito:**

CHEMIOTERAPIA CON FARMACO ORALE

ABEMACICLIB IN ASSOCIAZIONE ALLA TERAPIA ENDOCRINA


La informiamo che tale farmaco è indicato per il trattamento adiuvante del carcinoma mammario di cui è stata/o operata/o e che il suo utilizzo in associazione alla terapia endocrina ha prodotto un miglioramento statisticamente significativo della sopravvivenza libera da malattia invasiva rispetto alla sola terapia endocrina.

La informiamo che la dose raccomandata di ABEMACICLIB è di 150 mg due volte al giorno in associazione alla terapia endocrina per un totale di 2 anni di terapia.

La informiamo che ci può essere il rischio di effetti collaterali, anche gravi, a seguito della somministrazione di questo farmaco.

Le reazioni avverse più frequenti che sono segnalate sono:

- Diarrea
- Vomito
- Nausea
- Stomatite
- Dispepsia
- Appetito ridotto
- Mal di testa
- Disgeusia
- Capogiro
- Neutropenia
- Leucopenia
- Anemia

	DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER CHEMIOTERAPIA CON ABEMACICLIB IN ASSOCIAZIONE ALLA TERAPIA ENDOCRINA	UOC DM – UOC ONCOLOGIA 1 MOD 73-2023 Rev. 00 14.11.2023 PAG 2 DI 2
---	---	--

- Trombocitopenia
- Linfopenia
- Neutropenia febbrile
- Infezioni
- Alopecia
- Prurito
- Eruzione cutanea
- Cute secca
- Disturbi oculari
- Lacrimazione aumentata
- Visione annebbiata
- Occhio secco
- Tromboembolismo venoso
- Malattia interstiziale polmonare/polmonite
- Patologia delle unghie
- Debolezza muscolare
- Piressia
- Stanchezza
- Alanina aminotransferasi aumentata
- Aspartato aminotransferasi aumentata
- Creatinina aumentata

Gli effetti sopra riportati sono generalmente reversibili.

La informiamo che in rari e imprevedibili casi, come avviene con l'utilizzo di molti farmaci antitumorali, possono accadere tossicità di alto grado e talvolta potenzialmente fatali.

La **informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma lì ___/___/_____