 <p>UNIVERSITÀ DEL SALENTO IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI</p>	<p>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER ORMONOTERAPIA ANALOGHI DELL’LH-RH</p>	<p>UOC DM – UOC ONCOLOGIA 1 MOD 81-2023 Rev. 00 14.11.2023 PAG 1 DI 2</p>
--	--	--

Gentile Signora,

Egregio Signore

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario definito:**

ORMONOTERAPIA ANALOGHI DELL’LH-RH NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA OPERATO

Lei è stata/o recentemente sottoposta/o ad intervento chirurgico (e chemioterapia) per neoplasia della mammella. Il trattamento che le proponiamo è un trattamento ormonale costituito dall’analogo dell’LH-RH.

La **informiamo** che l'agente agonista dell’LH-RH è un decapeptide di origine ipotalamica che determina una inibizione indiretta della sintesi degli ormoni steroidei.



L’analogo dell’LHRH viene somministrato alla dose di 3.75 mg ogni 28 giorni ed in alternativa alla dose di 11.25 mg ogni 84 giorni mediante iniezione sottocutanea/intramuscolare.

La **informiamo** sugli effetti indesiderati/possibili rischi:

Tossicità degli agonisti dell’LH-RH.

Come conseguenza della diminuzione dei livelli di estrogeni, gli eventi avversi più comunemente riportati, sono stati: mal di testa, diminuzione della libido, disordini del sonno, alterazione dell’umore, dispareunia, dismenorrea, emorragia genitale, sindrome da iperstimolazione ovarica, ipertrofia ovarica, dolore pelvico, dolore addominale, secchezza vulvovaginale, iperidrosi, vampate di calore e astenia. Raramente sono stati descritti eritemi allergici e sintomi da intolleranza. L’uso degli agonisti del GnRH può causare riduzione della densità minerale ossea. Raramente il trattamento con agonisti del GnRH può rivelare la presenza di un pre- esistente, non noto, adenoma pituitario delle cellule gonadotrope. Sono stati descritti eritema ed infiammazione sul sito di iniezione. È possibile, anche se improbabile, che la terapia proposta determini l'interruzione definitiva del ciclo mestruale con l'instaurarsi di menopausa.

La **informiamo** sui benefici dei farmaci

 	<p>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER ORMONOTERAPIA ANALOGHI DELL’LH-RH</p>	<p>UOC DM – UOC ONCOLOGIA 1 MOD 81-2023 Rev. 00 14.11.2023 PAG 2 DI 2</p>
---	---	--

È presumibile che Lei possa trarre dall’uso di LHRH analogo, in associazione a terapia con Tamoxifen o un Inibitore dell’Aromatasi, un beneficio diretto, in quanto i farmaci che assumerà contribuiranno a ridurre la possibilità di ricaduta della sua malattia.

La **informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma lì ___/___/___