

 	<b>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA</b> <b>ONCOLOGICA</b> <b>MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE</b> <b>SANITARIA</b> <b>EPIDURALE ANTALGICA/INIEZIONE INTRATECALE</b> <b>ANTALGICA</b>	<b>UOC DM – UOSD TDD</b> <b>MOD 02-2022</b> <b>Rev. 00</b> <b>05.12.2022</b> <b>PAG 1 DI 3</b>
---	--	--

**Gentile Signora,**  
**Egregio Signore,**

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia, Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario diagnostico/operativo/terapeutico** definito:

- EPIDURALE ANTALGICA**
- INIZIONE INTRATECALE ANTALGICA**

La **informiamo** che:

tale procedura consiste nell'iniezione di anestetici locali mediante un apposito ago nello spazio peridurale o intratecale della colonna vertebrale, in prossimità delle radici nervose. In alcuni casi, se necessario, può essere utilizzato cortisone peridurale.

Lo spazio peridurale può essere definito come una zona all'interno del canale vertebrale compresa tra il midollo spinale e l'emergenza dei nervi deputati alla trasmissione della sensibilità dolorifica. I farmaci iniettati agiscono in maggior percentuale localmente, quindi in modo più efficace e con minori effetti collaterali generali.

La **informiamo** che In taluni casi può essere necessaria una precedente analgesia spinale per permettere al paziente di assumere la posizione richiesta: si tratta di una puntura che permette l'iniezione di farmaco anestetico in basse concentrazioni direttamente nello spazio liquorale, con immediato sollievo dalla patologia dolorosa.

### **Consigli per la preparazione all'esame**

La mattina della procedura può effettuare una colazione leggera. Indossi abiti comodi e venga sempre accompagnato, si sconsiglia di non guidare il giorno della procedura.

Nel caso in cui assuma farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti, in previsione dell'esame, è necessaria la loro sospensione e/o sostituzione, secondo le indicazioni che lo specialista di riferimento le fornirà. Sarà necessaria l'esecuzione di test ematici per la valutazione dell'assetto coagulativo e delle piastrine.

### **Modalità di esecuzione:**

La **informiamo** che:

il paziente verrà fatto accomodare sul lettino apposito in posizione seduta o declive laterale, con le gambe flesse e con il dorso ben curvato, in modo che sia più facile trovare i punti di riferimento e

 	<b>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA</b> <b>ONCOLOGICA</b> <b>MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE</b> <b>SANITARIA</b> <b>EPIDURALE ANTALGICA/INIEZIONE INTRATECALE</b> <b>ANTALGICA</b>	<b>UOC DM – UOSD TDD</b> <b>MOD 02-2022</b> <b>Rev. 00</b> <b>05.12.2022</b> <b>PAG 2 DI 3</b>
---	--	--

in modo che la pratica sia più agevole possibile, compatibilmente con le condizioni cliniche e lo stato doloroso del paziente. Un'anestesia locale della cute permette l'inserimento indolore di un ago apposito in corrispondenza delle strutture interessate e, attraverso di esso, vengono iniettati i farmaci. La procedura verrà effettuata sterilmente.

In accordo con le esigenze terapeutiche si può procedere all'inserimento di un cateterino flessibile da lasciare nella sede di inserzione, da collegare ad un serbatoio che continuerà a infondere farmaco in maniera controllata. La procedura viene eseguita sotto costante monitoraggio delle funzioni cardiovascolari del paziente.

Alla fine delle manovre terapeutiche il paziente resterà presso le nostre strutture, a riposo e sotto costante osservazione, per un lasso di tempo considerato ragionevole dall'operatore. Gli infermieri dell'ambulatorio, coordinati dall'anestesista, provvederanno a controllare periodicamente la pressione arteriosa, l'attività cardiaca, il respiro, intervenendo immediatamente per trattare efficacemente l'eventuale nausea, brivido o qualsiasi altro tipo di problema dovesse insorgere.

### **Analgesia spinale**

**La informiamo** che in particolari situazioni, si propone e si esegue una analgesia spinale, come unica procedura o prima dell'epidurale vera e propria. In questa fase il paziente sarà nella stessa posizione, sarà soggetto alle medesime manovre di disinfezione e anestesia locale, e subirà un immediato sollievo dal dolore.

L'analgesia spinale può essere gravata, come qualsiasi atto medico, da rare complicanze quali ipotensione transitoria e cefalea (che compare nella stazione eretta, risolvibile in 1 – 7 giorni e che può essere contrastata con paracetamolo).

### **Complicanze**

La **informiamo** che tale procedura, come accade per tutte le discipline mediche, non è esente da complicanze, anche se attuate con perizia, diligenza e prudenza, tra cui:

- Complicanze infettive
- Incompleta risoluzione della sintomatologia dolorosa
- Puntura accidentale vascolare
- Disagi locali presso il sito di puntura
- Reazione allergica

 	<b>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA</b> <b>ONCOLOGICA</b> <b>MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE</b> <b>SANITARIA</b> <b>EPIDURALE ANTALGICA/INIEZIONE INTRATECALE</b> <b>ANTALGICA</b>	<b>UOC DM – UOSD TDD</b> <b>MOD 02-2022</b> <b>Rev. 00</b> <b>05.12.2022</b> <b>PAG 3 DI 3</b>
---	--	--

- Insorgenza di sincope vasovagale (sensazione di calore, sudorazione, e stordimento fino alla perdita di coscienza che di solito si verifica in alcune persone predisposte)
- Cefalea per perforazione della dura madre che tipicamente compare assumendo la posizione eretta, e può durare per giorni (di solito a risoluzione spontanea o con l’ausilio di paracetamolo)
- Trauma radicolare con riacutizzazione di dolore
- Disturbi gastro-intestinali ed/o endocrini, che possono richiedere eventuale specifico trattamento.

La **informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.