



| | | |
|---|--|--|
|   | <p>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER TERAPIA CON EVEROLIMUS</p> | <p>DM – UOSD ENDOCRINOLOGIA ONCOLOGICA MOD 03-2024 Rev. 00 01.06.2022 PAG 1 DI 2</p> |
|---|--|--|

Gentile Signora,
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia, Lei dovrà essere sottoposto ad un **trattamento sanitario definito**:

TERAPIA CON EVEROLIMUS

Il trattamento sanitario verrà somministrato per via orale.

La **informiamo** che la terapia con Everolimus è indicata come terapia per il trattamento dei/delle pazienti con tumori neuroendocrini di origine pancreatica, ben o moderatamente differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, in soggetti adulti.

La **informiamo** che Everolimus deve essere somministrato per via orale una volta al giorno alla stessa ora, regolarmente con o senza cibo. Le compresse devono essere inghiottite intere, con un bicchiere d'acqua. Le compresse non devono essere masticate o frantumate.

La **informiamo** che la terapia con Everolimus è una terapia ben tollerata. Esiste tuttavia, la possibilità di effetti secondari per i quali verranno prese tutte le misure terapeutiche necessarie.

In particolare, i possibili effetti indesiderati più frequenti derivati da questo trattamento sono:

- Polmonite non infettiva: una diagnosi di polmonite non infettiva deve essere presa in considerazione in presenza di segni respiratori non specifici e sintomi quali ipossia, versamento pleurico, tosse o dispnea per i quali siano state escluse, dopo appropriate analisi, cause infettive, neoplastiche e altre motivazioni non correlate al farmaco. Si invita ad avvisare prontamente l'insorgenza di ogni sintomo respiratorio nuovo o in peggioramento.
- Infezioni: Everolimus ha proprietà immunosoppressive e può predisporre i/le pazienti ad infezioni batteriche, micotiche, virali o da protozoi, comprese infezioni con patogeni opportunistici.
- Reazioni di ipersensibilità: reazioni di ipersensibilità che si possono manifestare con sintomi comprendenti, ma non limitati a: anafilassi, dispnea, vampate, dolore al torace o angioedema (es. gonfiore delle vie respiratorie o della lingua, con o senza compromissione respiratoria).
- Ulcerazioni del cavo orale: ulcere della bocca, stomatiti e mucositi del cavo orale. In questi casi sono raccomandati trattamenti topici, ma deve essere evitato l'uso di collutori contenenti alcool o perossidi perché possono peggiorare la condizione. Non si devono usare agenti antifungini se non è stata diagnosticata un'infezione micotica.

- Insufficienza renale: la funzione renale deve essere monitorata in particolare quando siano presenti fattori di rischio aggiuntivi, che possono compromettere ulteriormente la funzione renale.
- Alterazioni metaboliche: Iperglicemia, iperlipidemia e ipertrigliceridemia che potrebbero necessitare di terapia specifica.
- Alterazioni dell'emocromo: riduzioni dell'emoglobina, dei linfociti, dei neutrofili e delle piastrine che potrebbero necessitare di terapia specifica.

La **informiamo** che altri possibili effetti collaterali possono riguardare:

- ✓ Fertilità: in età fertile è necessario utilizzare un metodo contraccettivo di elevata efficacia e/o sterilizzazione femminile/maschile durante l'utilizzo di Everolimus, e fino a otto settimane dopo la fine del trattamento.
- ✓ Allattamento: non è noto se Everolimus sia escreto nel latte umano. Tuttavia, nei ratti, Everolimus e/o i suoi metaboliti passano rapidamente nel latte. Pertanto, le donne in trattamento con Everolimus non devono allattare al seno.

La **informiamo** che durante l'assunzione di Everolimus è sconsigliato assumere farmaci interferenti con l'assorbimento e l'eliminazione del farmaco. Nel caso in cui fosse necessario introdurre un nuovo farmaco in terapia, si consiglia di consultare l'endocrinologo/a che darà il suo assenso o meno al nuovo trattamento.

La **informiamo** che non sono stati effettuati studi riguardanti gli effetti di Everolimus sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Pertanto, si avvisa di prestare attenzione alla guida o nell'utilizzo di macchinari qualora si manifestino stanchezza o capogiri durante il trattamento.

La **informiamo** che gli/le studenti/studentesse in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti/e anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.