

contribuire a diminuire il rischio di diffusione dell'infezione anche a livello del cavo orale.



Il vaccino contro l'HPV può prevenire i tumori orofaringei?

Il vaccino contro l'HPV è stato sviluppato per prevenire il cancro del collo dell'utero perché protegge da quei tipi virali maggiormente responsabili del processo di carcinogenesi in questa sede. Alcuni dei ceppi virali inclusi nel vaccino però, sono anche responsabili dell'infezione orale. Il vaccino contro HPV potrebbe quindi prevenire anche l'insorgenza dei tumori orofaringei. Tuttavia, fino ad oggi, pochi dati sono stati raccolti sull'efficacia del vaccino contro l'infezione orale da HPV.



È utile eseguire un test per individuare l'HPV orale?

No. Attualmente non si raccomanda l'esecuzione di un test di routine per individuare l'HPV a livello orale. Questo perché: a) Non esiste un metodo di


laboratorio affidabile per raccogliere campioni dalla cavità orale; 2. Non esiste un trattamento specifico per eliminare l'HPV, se risultasse positivo il test; 3. Il test HPV nella cavità orale non è nemmeno utile per la diagnosi precoce del tumore dell'orofaringe, perché la storia naturale del tumore non prevede la presenza di lesioni pre-neoplastiche da intercettare con lo screening.


Per qualsiasi dubbio o necessità sull'infezione da HPV e sulla vaccinazione puoi rivolgerti agli operatori del Centro per le Infezioni Sessualmente Trasmissibili dell'Istituto Dermatologico San Gallicano aperto tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì in
Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma
(zona Mostacciano-Eur)

Realizzazione a cura di:
UOSD Malattie Sessualmente Trasmesse (MST),
Malattie Tropicali e delle Migrazioni
Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS
&
UOC Anatomia Patologica
IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma

L'infezione orale da HPV nel maschio





L'infezione da HPV può colpire il cavo orale?

Sì. Il Papillomavirus Umano (HPV) può infettare le mucose della cavità orale e quelle dell'orofaringe (la parte posteriore della gola, compresa la base della lingua e le tonsille) anche se con più difficoltà rispetto alle mucose dei genitali e all'epidermide.



Come si contrae l'infezione orale da HPV?

HPV può raggiungere le mucose del cavo orale in diversi modi, principalmente durante i rapporti sessuali oro-genitali.



Quanto è diffusa l'infezione orale da HPV?

Nel mondo, la prevalenza dell'infezione orale da HPV nella popolazione generale è piuttosto bassa (5-7%). Tuttavia, l'infezione risulta essere molto più elevata (5-6 volte) nella popolazione maschile. Questo perché i maschi, più delle donne,

concentrano maggiori fattori di rischio per l'infezione, come lo scambio di rapporti oro-genitali tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini (MSM). Gli studi indicano, infatti, che tra gli MSM le prevalenze dell'infezione orale da HPV sono significativamente più elevate di quelle della popolazione generale. Inoltre, tra coloro che hanno contratto l'infezione da HIV, il rischio di avere un'infezione orale da HPV è ancora più elevato.



Quali fattori di rischio sono associati all'infezione orale da HPV?

Diversi fattori sono stati descritti come associati al rischio di infezione da HPV a livello orale: l'età, il sesso, il fumo, l'eccessivo consumo di alcol, il comportamento sessuale e l'immunodepressione (come negli individui con infezione da HIV). Nel dettaglio, il sesso maschile, il fumo e un elevato numero di contatti sessuali orali nel corso della vita rappresentano i principali fattori che aumentano il rischio di infezione.



Quali sono le conseguenze dell'infezione orale da HPV?

È importante sottolineare che la maggioranza delle infezioni orali da HPV è transitoria e asintomatica. Tuttavia, quando l'infezione diventa persistente, può determinare lo sviluppo del carcinoma squamoso dell'orofaringe, soprattutto se causata dall'HPV16. Nel mondo, l'HPV è infatti responsabile di circa il 30% di tutti i tumori orofaringei. L'incidenza di questi tumori sta aumentando negli ultimi anni, soprattutto nei paesi occidentali e nella popolazione maschile. Nonostante i tumori orofaringei causati dall'HPV mostrino una prognosi e una risposta alla terapia migliori rispetto a quelli HPV-negativi, circa il 20% di questi, purtroppo, è soggetto a recidive.



Come posso ridurre le probabilità di contrarre l'HPV a livello orale?

Utilizzare il preservativo correttamente durante i rapporti sessuali genitali e oro-genitali, soprattutto tra gli MSM, può