

	DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA DERMATOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER TERAPIA INIETTIVA PER INFEZIONE GONOCOCCICA	UOC DM – UOSD MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (MST) E MALATTIE TROPICALI MOD 07-2024 Rev. 00 06.06.2024 PAG 1 DI 3
---	--	---

Gentile Signora,

Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario** definito:

TERAPIA INIETTIVA PER INFEZIONE GONOCOCCICA

La **informiamo** che Lei è affetto da infezione da ***Neisseria Gonorrhoeae (Gonococco)***, una delle malattie sessualmente trasmissibili più comuni a livello mondiale.

Il Gonococco è presente nelle secrezioni delle mucose delle persone infette, e si trasmette con rapporti sessuali non protetti orali, vaginali e anali o durante il parto dalla madre al bambino.

La **informiamo** che di solito, 2-7 giorni dopo il contagio compaiono i primi sintomi.

Nell'uomo, si manifestano principalmente con un arrossamento e un gonfiore del meato dell'uretra con una sensazione di bruciore durante la minzione e la comparsa di secrezione purulenta (da cui il termine popolare «scolo»).

La **informiamo** che se non viene trattata, l'infezione si estende alla prostata e agli epididimi. Allo stesso modo, nella donna l'infezione si manifesta in primo luogo con un aumento delle secrezioni vaginali e con una sensazione di dolore durante la minzione.

La **informiamo** che se l'infezione non viene curata, sussiste il pericolo che si diffonda nella zona pelvica.

Tuttavia, l'infezione decorre spesso (più frequentemente nella donna che nell'uomo) in maniera asintomatica, e perciò può rimanere nascosta per lungo tempo.

La **informiamo** che a seconda delle pratiche sessuali, l'infezione può coinvolgere anche il cavo orale, la gola, la regione ano-rettale e in questi casi può decorrere in modo asintomatico o sotto forma paucisintomatica.

La **informiamo** che la terapia iniettiva a cui verrà sottoposto è la seguente:

- Ceftriaxone 1 g: una fiala intramuscolo; in singola somministrazione.

La **informiamo** che gli eventuali eventi avversi legati alla suddetta terapia possono essere:

- dolore nel sito di iniezione,

	DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA DERMATOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER TERAPIA INIETTIVA PER INFEZIONE GONOCOCCICA	UOC DM – UOSD MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (MST) E MALATTIE TROPICALI MOD 07-2024 Rev. 00 06.06.2024 PAG 2 DI 3
---	--	---

- riduzione dello stato di coscienza,
- movimenti anormali,
- agitazione e convulsioni,
- improvviso gonfiore del viso, della gola, delle labbra o della bocca,
- reazioni allergiche anche gravi,
- shock anafilattico,
- sindrome di StevensJohnson e necrolisi epidermica tossica, note anche con le sigle SJS e TEN,
- anomalie dei globuli bianchi (come riduzione dei leucociti e aumento degli eosinofili) e delle piastrine (diminuzione dei trombociti),
- feci molli o diarrea,
- alterazioni nei risultati degli esami del sangue per la funzionalità del fegato,
- eruzione cutanea
- ed altri presenti nel foglio illustrativo del farmaco.

La **informiamo** che in caso di nota o sospetta allergia ad antibiotici appartenenti alla classe delle cefalosporine e/o betalattamici, la terapia iniettiva a cui verrà sottoposto è la seguente:

- Gentamicina 240 mg intramuscolo.

La informiamo che in tal caso gli eventuali eventi avversi legati alla suddetta terapia possono essere:

- comparsa di proteinuria,
- compromissione della funzione renale,
- insufficienza renale acuta,
- iperfosfaturia,
- aumento dell'azotemia (reversibile),
- Sindrome simil Fanconi con aminoaciduria e acidosi metabolica,
- ronzii,
- riduzione della sensibilità uditiva che può essere irreversibile,
- convulsioni,
- allucinazioni,
- vertigini,
- attacchi epilettici,
- tinnito,
- torpore,
- parestesie,
- fascicolazioni,
- sindrome tipo miastenia gravis,
- febbre,

 	DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA DERMATOLOGICA MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER TERAPIA INIETTIVA PER INFEZIONE GONOCOCCICA	UOC DM – UOSD MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (MST) E MALATTIE TROPICALI MOD 07-2024 Rev. 00 06.06.2024 PAG 3 DI 3
---	--	---

- cefalea,
- polineuropatie,
- encefalopatia,
- blocco neuromuscolare,
- capogiri,
- danno vestibolare,
- perdita dell'udito,
- malattia di Ménière,
- tinnito,
- vertigini,
- reazioni di ipersensibilità di gravità variabile,
- da eruzione cutanea e prurito,
- febbre da farmaco alle gravi reazioni acute da ipersensibilità (anafilassi) fino allo shock anafilattico,
- anemia,
- leucopenia,
- granulocitopenia,
- agranulocitosi transitoria,
- eosinofilia,
- aumento o riduzione dei reticolociti,
- trombocitopenia,
- discrasia
- ed altri presenti nel foglio illustrativo del farmaco.

La **informiamo** che la Gonorrea è una patologia infettiva e la invitiamo a indirizzare in maniera confidenziale il/i suo/suoi partner al nostro centro per uno screening completo ed eventuale trattamento.

La **informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.