Gentile Signora,
Egregio Signore,

**La informiamo** che, in base alla Sua patologia:

---

Lei dovrà essere sottoposto a un trattamento sanitario definito:

TERAPIA CON FARMACO CAPIVASERTIB per via ORALE

IN ASSOCIAZIONE ALLA TERAPIA ENDOCRINA CON FULVESTRANT

**La informiamo** che tale farmaco è indicato, in associazione alla terapia endocrina con Fulvestrant, per il trattamento del carcinoma mammario metastatico endocrino resistente e, che il suo utilizzo, ha prodotto un miglioramento statisticamente significativo della sopravvivenza libera da progressione rispetto alla sola terapia endocrina.

**La informiamo** che la dose raccomandata di Capivasertib è di 400 mg due volte al giorno (a distanza di circa 12 ore), per via orale, per 4 giorni consecutivi e 3 giorni di sospensione (lo schema di assunzione viene ripetuto in un ciclo settimanale), in associazione alla terapia endocrina con Fulvestrant 500 mg somministrata per via intramuscolare ogni 14 giorni per le prime 3 iniezioni e poi ogni 28 giorni; il trattamento sarà somministrato fino a che la paziente/il paziente trarrà beneficio clinico dalla terapia o fino a quando si verificasse una tossicità inaccettabile.

**La informiamo** che ci può essere il rischio di effetti collaterali, anche gravi, in seguito della somministrazione di questo farmaco.

Le reazioni avverse più frequentemente segnalate sono:

- Eruzione cutanea
- Cute secca
- Eritema multiforme
- Prurito
- Ipersensibilità
- Iperglicemia
- Aumento emoglobina glicosilata
- Mucosite
- Stomatite
- Formicolio a carico di mani e piedi

- Dolore
- Stanchezza
- Insonnia
- Bocca secca
- Dolore addominale
- Dispepsia
- Disgeusia
- Nausea
- Vomito
- Diarrea
- Appetito ridotto
- Mal di testa
- Capogiri
- Sincope
- Ipokaliemia
- Anemia
- Aumento creatinina
- Infezione delle vie urinarie
- Lesione renale acuta
- Febbre

Gli effetti sopra riportati sono generalmente reversibili.

Si rende noto comunque che solitamente il trattamento viene ben tollerato, con comparsa di scarsi effetti collaterali. In ogni caso dovrà riferire ai medici che la seguono eventuali effetti tossici riscontrati.

**La informiamo** che, in rari ed imprevedibili casi, come avviene con l'utilizzo di molti farmaci antitumorali, possono presentarsi tossicità di alto grado e talvolta potenzialmente fatali.

**La informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma lì___/___/_____