Gentile Signora,

Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario** definito:

TERAPIA CON CEFTRIAXONE

TERAPIA CON CEFTRIAXONE PER VIA INTRAMUSCOLARE PER INFEZIONE DA GONOCOCCO

Farmaco: Ceftriaxone 1 g (una fiala da 1 g per via intramuscolare)

Indicazioni:

Il Ceftriaxone è il trattamento di prima linea per la gonorrea non complicata, un'infezione a trasmissione sessuale causata da *Neisseria Gonorrhoeae*. È raccomandato per il trattamento delle infezioni urogenitali, rettali e faringee, secondo le linee guida internazionali (CDC MMWR 2021, IUSTI STI Guidelines). Il trattamento tempestivo è importante per evitare complicanze come malattia infiammatoria pelvica, epididimite e infertilità.

Perché viene usato il Ceftriaxone:

Il Ceftriaxone è una cefalosporina di terza generazione altamente efficace contro *Neisseria Gonorrhoeae*. È attualmente l'antibiotico che presenta **il più basso rischio di indurre resistenze**, rispetto ad altri farmaci precedentemente usati, come l'Azitromicina o la Doxiciclina.

Esperienze e dati a supporto:

Negli ultimi anni, sono aumentati i casi di gonorrea resistente a diversi antibiotici. Tuttavia, *Neisseria Gonorrhoeae* continua a mostrare un'elevata sensibilità al Ceftriaxone, con efficacia documentata superiore al 98% nei principali studi clinici.

Vantaggi della somministrazione intramuscolare singola:

- Una sola iniezione da 1 g è sufficiente per trattare l'infezione in modo efficace.
- Consente una rapida eradicazione del patogeno, migliorando l'aderenza terapeutica.
- Evita la necessità di cure domiciliari o terapia orale prolungata.

Modalità di somministrazione:

- Il farmaco viene somministrato tramite una singola iniezione intramuscolare profonda (solitamente nel gluteo).
- È importante rilassare il muscolo per ridurre il dolore durante l'iniezione.

Possibili effetti collaterali:

- Reazioni cutanee nella sede dell'iniezione.
- In rari casi: diarrea, nausea, mal di testa o reazioni allergiche (es. eruzione cutanea, prurito, gonfiore).
- Reazioni allergiche gravi (anafilassi) sono molto rare come gonfiore delle mucose e difficoltà respiratorie o eruzioni cutanee.

Nota importante:

È fondamentale astenersi dai rapporti sessuali fino alla risoluzione completa dei sintomi e per almeno 7 giorni dopo il trattamento. Anche il/la partner deve essere valutato/a e trattato/a, se indicato. Sono raccomandati i test per altre IST (es. sifilide, HIV, clamidia).

Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al proprio medico o al personale del centro IST.

La **informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.